





Medication Information Leaflet
Administration Leaflet: Dissolving Sachets

溶解药粉

如何溶解药粉？

<p>1. 如果您需要服用<u>半包药粉</u>，将药包放平，并确保里面的药粉均匀分配。</p>	
<p>2. 将药包摺半。</p>	
<p>3. 剪开药包的顶端。</p>	
<p>4. 跟着指示倒出<u>半包</u>或<u>整包</u>药粉进杯里。</p>	
<p>5. 把凉开水倒入杯里。</p> <ul style="list-style-type: none">• 乙酰半胱氨酸(Acetylcysteine)- 加入少量的水• 环硅酸锆钠(Sodium zirconium cyclosilicate)- 加入 45 毫升的水• 消胆胺(Cholestyramine), 枸橼酸钠(Citravescent® or Ural®), Fybogel- 加入一杯水 (200-250 毫升)• Forlax- 加入一杯水 (200-250 毫升) (当您服用一包药粉) / 加入半杯水(当您服用半包药粉)。您可以选择用其它饮料，例如果汁或牛奶，<u>但请不要加入汽水</u>。	



Version 2

Last Review: 10/6/2021

Produced by Department of Pharmacy
KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®

6. 用汤匙搅拌，使药粉完全溶于水中。



7. 确保您把药水喝光。您可使用药杯 / 针筒喂您的小孩吃药。



Version 2

Last Review: 10/6/2021

Produced by Department of Pharmacy
KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®