

Medication Information Leaflet

Mirabegron

米拉贝隆缓释片

米拉贝隆缓释片的用途:

此药用于治疗膀胱过度活动征。它能使膀胱肌肉松弛并减少不自主的膀胱肌收缩，恢复逼尿肌的功能。因此奥昔布宁有助缓解有紧迫性尿失禁、尿急、尿频等症状的膀胱过度活动症。

米拉贝隆缓释片的副作用和应对方法

此药可能会引起一些副作用。其中包括:

- 心跳加速（心动过速）
- 头疼，尤其是突如其来的搏动性头痛
 - 若头疼得难以忍受，请尽快告知医生。因为这也可能是血压极高的症状。
- 血压上升
 - 请多加监测血压。服药期间一旦发现血压不断持续上升的现象或是已经达到160/90mmHG，请告知医生。**注意：若血压以达到180/110mmHG，请立即到急诊部求医。**
- 恶心，反胃
 - 可以少吃多餐，尽量少吃油腻，辛辣的食物
- 腹泻
- 便秘
 - 可以多喝水（除非医生已限制您的饮水量），摄取高纤维食物和多运动。
- 尿道感染
- 头晕

除了以上副作用，如果服药后对此药过敏您可能会出现脸部肿胀、皮肤出现红疹、皮痒、呼吸困难的症状。一旦发生这种情形，请立即停止服用药物并马上求医。

特殊指示

请在服用药物前确保:

- 没有对此药过敏
- 没有怀孕或是在哺乳
- 没有尿潴留、膀胱梗阻
- 没有肝、肾及心脏疾病
- 您的血压控制良好并未超标

在服用米拉贝隆缓释片时有什么要戒口的？

- 请勿饮酒以免增加瞌睡，困倦及头晕的风险
- 若欲服用任何其他药物，包括保健品或中药前，请咨询您的医生或药剂师

如何服用米拉贝隆缓释片？

- 除非您对药物敏感或产生严重反应，请勿擅自停止服药
- 此药通常只需一天一次服用
- 饭前饭后皆可
- 在服用米拉贝隆缓释片时，应整粒吞服，不可打开、咬碎或咀嚼胶囊

忘了服用该怎么办？

记起时，尽快补服。如果已接近下一次服药的时间，请勿补服。只需按日常服药的时间，服一个剂量即可。切勿服用双倍的药量来补回已漏服的药量！

存放方式

置放在阴凉、干燥的地方。避光、避热。

请置于儿童不易触及之处。

扔药之前请包裹在垃圾袋里，再丢进垃圾桶。



Last Review: 10/08/2021

Produced by Department of Pharmacy
KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®