

LEVETIRACETAM

(左乙拉西坦)

KEPPRA®

病人须知

此册为您解答一些对于此药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问，可请教医生或药剂师。

此药有什么用途？

Levetiracetam 用于控制癫痫或惊风发作，也可用于神经系统的其他病例。

何时服用此药？

- 通常每日口服两次。刚开始服药时，医生会用较低的剂量，然后逐步地将剂量增加。请遵守标签上的指示，若有疑问，请向药剂师或医生询问。
- 在未经过医生的同意之前，请勿自行调整剂量或停止服药。突然停止服用此药会导致惊风症状不受控制。
- 若无医生同意，请勿擅自更换药物品牌或剂型。这应在医生密切监督下进行。

如何服用此药？

□ 药水

服用前将药水摇匀。请用药房提供的茶匙或注射管喂药。勿用家用汤匙量药水，因为家用汤匙不能准确地量出剂量。此药水可用些许开水冲淡后，再让孩子服用。药水在开瓶后应储存于室温，并可保存七个月。此药水应收于原瓶。

□ 普通药片

将整粒药片与开水吞服。此药可与食物一起服用或空肚服用。

忘记或漏服药该怎么办？

- 立即补服药物。若已接近下次服药的时间，不必补服而依照下次服药的时间服药。
- 勿连服两剂 或自行增加剂量。
- 若孩子漏服两剂或以上的药物或您不清楚该怎么做，请向您的医生或药剂师询问。
- 若您孩子只剩两星期或更少的药量，请确保您已安排孩子下一次的复诊，或已得药单准备往药房购买药物。

此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

常见的副作用通常会在孩子开始服药期间出现。常见的副作用包括：

- 头晕，嗜睡，头痛或疲倦，身体乏力，双重视野
若服用其他药物要特别小心， 伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用。孩子进行骑脚
车、游泳、或其他类似活动时， 家长必须谨慎督促。
- 行为异常，如焦虑、沮丧、易动怒、产生挑衅行为
- 颈项酸痛，动作不协调，皮肤刺痛，刺痒
- 恶心，呕吐，肚痛，食欲不振，腹泻或便秘
若觉得肠胃不适， 药物可与食物一起服用，但勿用汽水服药。
- 咳嗽，喉咙痛，鼻子过敏

若以上副作用在几天后仍没有消失， 或影响孩子的日常生活， 请告知医生。

此药可能导致一些罕见但严重的副作用。若出现以下副作用，请立即通知医生或到
急诊部求医：

- 幻想或幻觉
- 皮疹，皮肤红痒、脱皮
- 不寻常的出血或淤血，持续发烧、喉咙痛、口疮

若服用药后出现其他不寻常的现象， 请告知医生。若对于孩子服用药物有任何疑问
或困难，请与您的医生交谈或讨论。

其他资讯

在让孩子服用其他药物、补充品或草药前， 请告知医生或药剂师。

若孩子由于任何原因必须向其他医生求诊， 请告知他孩子在服用此药物。



Version 1

Last Review: 27/9/2017

Produced by Department of Pharmacy
KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®